

STARKORAT BLOCK CERAT

Momeala pentru rozatoare sub forma de bloc cerat, pe baza de brodifacoum
Actioneaza asupra tuturor rozatoarelor chiar daca sunt rezistente la alti anticoagulanti

Compozitie:

100g de formulat contin

Brodifacoum pur	0,005g
Denatonium benzoat	0,001g
Zaharuri, faini, arome apetisante, parafina	100g

Familia Brodifacoum	Hydroxycoumarin derivative
Modalitati de actiune	Prin inghitire
Activitate	Inhiba vitamina K1 si ca urmare altereaza coagularea sangelui
Specii controlabile	sobolani de canal – Rattus norvegicus, sobolani negri sau de acoperis – Rattus rattus, soareci de casa – Mus musculus, soareci de camp intrati in gospodarii

Familia Denatonium Benzoat	Benzyl-diethyl(2,6-xylylcarbonyl)ammonium benzoate
Modalitati de actiune	Prin inghitire
Activitate	Face substanta extrem de amara
Specii care nu detecteaza prezenta substantei pana la 0,001g/100g momeala	Rattus rattus, Rattus Norvegicus, Mus Musculus, etc.

Formulare

In STARKORAT BLOCK CERAT brodifacoum-ul este formulat in momeli constand dintr-un amestec echilibrat de produs comestibil cerat. Acest lucru face ca momeala sa aiba o rezistenta remarcabila impotriva umezelii. STARKORAT BLOCK CERAT poate fi utilizat in locuri unde momelile traditionale pot sa dezvolte mucegai si isi pierd mai repede efectul. Se poate utiliza cu succes in deratizarea oricarui ambient domestic si civil (case, birouri, comunitati, industrie) si pentru tratamente specifice in locuri deosebit de umede (retele de scurgere, canaluri, tuburi, etc).

Momelile contin denatonium benzoat, substanta extrem de amara, ceea ce descurajeaza ingerarea de catre copii si animalele de casa. Caracteristica principala a acestei substante, denatonium benzoat, este ca nu e detectata de o paleta larga de rozatoare la concentratia care o are STARKORAT BLOCK CERAT.

Specii care se pot controla

STARKORAT BLOCK CERAT este usor de acceptat si este consumat de toate speciile de rozatoare raspandite care sunt de obicei de gasit in mediul nostru: sobolani de canal – Rattus norvegicus, sobolani negri sau de acoperis – Rattus rattus, soareci de casa – Mus musculus, soareci de camp intrati in gospodarii.

Proprietati

Brodifacoum-ul reprezinta cel mai recent indirect rodenticid anticoagulant. Caracteristica sa esentiala este toxicitatea sa acuta in raport cu animalele tinta. O asemenea actiune permite uciderea rozatoarelor chiar si ca urmare a unei singure ingerari a unei mici cantitati de momeala. In plus, brodifacoum-ul se demonstreaza activ si fata de grupurile de rozatoare care au devenit rezistente la alti anticoagulanti.

FISA TEHNICA

Din compararea valorilor de toxicitate acuta, fata de soarelele domestic, este posibil sa se indice brodifacoum-ul ca fiind de doua ori mai eficace decat difenacoum-ul, de trei ori mai mult ca difethialon-ul si de patru ori fata de bromodialon. Rozatoarele intoxicate mor, ca si cu ceilalti anticoagulanti, fara suferinte, si de aceea, nu ii alarmeaza pe ceilalti indivizi care continua sa manance momeala. Antidotul specific pentru brodifacoum este vitamina K1.

Doze si modalitati de folosire

Se va dispune momeala cerata in interiorul locurilor infestate de rozatoare, daca este posibil, in apropiere de locurile frecventate de rozatoare, de-a lungul pistelor facute de acestia, de-a lungul peretilor, in colturi – niciodata in mijlocul incaperii – ferit de ploaie. In sediile cu grinzi, mansarde, plasati momelile in colturile inalte, intre grinzi si tavan. Momelile cerate trebuie puse in cutii de dispersie, fixate adecvat pentru a avea acces numai animalele-tinta, evitand asa si dispersia momelii in mediul inconjurator. Se verifica la 2-3 zile cantitatea de momeala si se va reinnoi la nevoie. In timpul deratizarii zona interesata trebuie sa fie semnalizata corespunzator. Eventualele rozatoare gasite moarte trebuie arse sau ingropate pentru a se evita fenomenul de otravire secundara.

Ingrediente active si toxicitate

Brodifacoum este caracterizat de o inalta toxicitate pentru rozatoare si pentru alte cateva mamifere.

LD50 – acut pe cale orala la sobolan 0,27 mg/kg

LD50 – acut pe cale orala la caine 1 mg/kg

LD50 – acut pe cale orala la soarece 0,40 mg/kg

LD50 – acut pe cale orala la pisica 25 mg/kg

Avertisment

Pentru o folosire corecta a produsului se va respecta in mod corespunzator tot ceea ce este scris pe eticheta. Se va citi si pastra fisa de securitate. Nu se vor contamina persoane si animale, alimente, bauturi si recipientii destinate acestora. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate fata de terti. Cel care foloseste produsul raspunde de eventualele daune care deriva din folosirea acestuia.

Antidotul specific este reprezentat de vitamina K1.